

Extensions séparables, normales et galoisiennes - TD 6

1. Soit $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polynôme irréductible de degré n . Si a est une racine de $f(x)$, montrer que $\{a, a^p, a^{p^2}, \dots, a^{p^{n-1}}\}$ est l'ensemble des racines de $f(x)$. En déduire que
 - (a) le corps de décomposition de $f(x)$ est $\mathbb{F}_p(a)$;
 - (b) $\mathbb{F}_p(a) \cong \mathbb{F}_{p^n}$;
 - (c) \mathbb{F}_{p^n} est une extension normale de \mathbb{F}_p ;
 - (d) \mathbb{F}_{p^n} est une extension galoisienne de \mathbb{F}_p .
2. Nous avons déjà vu que \mathbb{F}_4 est le corps de décomposition du polynôme $x^4 - x \in \mathbb{F}_2[x]$. Trouver un polynôme irréductible dans $\mathbb{F}_2[x]$ dont le corps de décomposition est isomorphe à \mathbb{F}_4 .
3. Montrer que :
 - (a) l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt{3}i)/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
 - (b) l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne.
 - (c) l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{3}i)/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
 - (d) l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\sqrt{3}i)/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
4. Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :
 - (a) l'extension $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ est galoisienne.
 - (b) l'extension $\mathbb{F}_p(x)/\mathbb{F}_p$ n'est pas galoisienne.
5. Donner l'exemple d'une extension qui :
 - (a) est séparable et normale.
 - (b) est séparable, mais pas normale.
 - (c) est normale, mais pas séparable.
 - (d) n'est ni normale ni séparable.